平成 15 年 5 月 1 日

電磁気学演習 **No.4** (静電ポテンシャル, クーロンの法則–連続電荷分布の場合–)

問 **1** *(円環状電荷) z 軸を中心軸とし, x-y 平面上にある半径 a の円周上に線電荷密度 λ の電荷が一様に分布している. このとき, 以下の問に答えよ.

(a) z 軸上における電場の z 成分 $E_z(z)$ をクーロンの法則から求め, z の関数として図示せよ.

(b) z 軸上における静電ポテンシャル $\Phi(z)$ を求め, z の関数として図示せよ.

(c) $\boldsymbol{E} = -\nabla\Phi$ より, z 軸上における電場の z 成分 $E_z(z)$ を求め, (a) の結果と一致することを示せ.

(d) z 軸上で電場の大きさが最大となる点を求め, その点における電場の大きさを求めよ.

問 **2** (円盤状電荷) z 軸を中心軸とし, x-y 平面上にある半径 R の円盤上に面密度 σ で電荷が一様に分布している. このとき以下の問いに答えよ.

(a)* z 軸上における電場の z 成分 $E_z(z)$ をクーロンの法則から求めよ.

(b)* z 軸上における静電ポテンシャル $\Phi(z)$ を求めよ.

(c)* $\boldsymbol{E} = -\nabla\Phi$ より, z 軸上における電場の z 成分 $E_z(z)$ を求め, (a) の結果と一致することを示せ.

(d)* z 軸上における電場の z 成分 E_z を z の関数として図示せよ. さらに, z 軸上で電場の大きさが最大となる点を求め, その点における電場の大きさを求めよ.

(e)** $R \to \infty$ とすると, 円盤は無限に広い平面となる. このときの電場の z 成分 $E_z(z)$ を求め, z の関数として図示せよ.

問 **3** *(球殻状電荷) 原点をその中心とする半径 R の球殻がある. この球殻上に面密度 σ の一様な電荷が分布しているとする. 極座標 (r, θ, ϕ) を用いて以下の問いに答えよ.

(a) z 軸上の点 $(r, 0, 0)$ での静電ポテンシャル $\Phi(r)$ を求め, r の関数として図示せよ.

(b) $\boldsymbol{E} = -\nabla\Phi$ より, 電場の r 成分 $E_r(r)$ を求めよ.

問 **4** **(線分状電荷) 一様な線密度 λ の電荷が z 軸上の $-a < z < a$ の範囲の線分上に分布している. 以下の問いに答えよ.

(a) 円柱座標上の点 (r, ϕ, z) における電場 $\boldsymbol{E}$ が

$$
\begin{aligned}
E_r &= \frac{\lambda}{4\pi\varepsilon_0 r}(\sin\alpha - \sin\beta) \\
E_\phi &= 0 \\
E_z &= \frac{\lambda}{4\pi\varepsilon_0 r}(\cos\beta - \cos\alpha)
\end{aligned}
$$

となることをクーロンの法則から求めよ. ただし,

$$\cos\alpha = \frac{r}{\sqrt{r^2+(z+a)^2}}, \qquad \cos\beta = \frac{r}{\sqrt{r^2+(z-a)^2}},$$
$$\sin\alpha = \frac{z+a}{\sqrt{r^2+(z+a)^2}}, \qquad \sin\beta = \frac{z-a}{\sqrt{r^2+(z-a)^2}}$$

である.

(b) 静電ポテンシャルを求め, $\boldsymbol{E} = -\nabla\Phi$ が (a) の結果と一致することを示せ.

(c) $a \to \infty$ とするとき, 電荷は無限に長い直線上に分布する. このとき作られる電場 $\boldsymbol{E}$ を求めよ.

問 **5** *** (球状電荷) 半径 R の球の内部に一様な電荷密度 ρ で電荷が分布している. 球の外部 $(r > R)$ および球の内部 $(r < R)$ にある点における電場 $\boldsymbol{E}$ をクーロンの法則からそれぞれ求め, r の関数として図示せよ. ただし, r は球の中心からの距離である.